

# 大腸癌に対する CPT-11+Cetuximab療法

(アービタックス+イリノテカン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2012年12月11日 承認  
2020年02月10日 改訂(第7版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(2回目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1( / ) ・ Day15( / )

## 《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用

### 本管

生理食塩水 500mL

側管  
(側管終了後、抜去可)

開始時 (15min)  
グラニセトロン 50mL/袋  
ポラミン5mg 1A  
デキサート3.3mg 1A  
(リン酸エステル換算 4mg)

専用ルート (初回2hr) (以後1hr)  
生理食塩水 アービタックス  
初回 mg  
以後 mg

(1hr) 生理食塩水 250mL

(2hr) 5%ブドウ糖 250mL  
イリノテカン mg

全開で 生理食塩水 50mL

全量

初回 以後 mL mL

Day2( / ) ・ Day3( / )

Day16( / ) ・ Day17( / )

## 《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を  
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用

Day8( / ) Day22( / )

### 本管

生理食塩水 500mL

側管  
(側管終了後、抜去可)

(15min) 生理食塩水 50mL  
ポラミン5mg 1A  
デキサート6.6mg 1V  
(リン酸エステル換算 8mg)

専用ルート (1hr) 生理食塩水 150mL  
アービタックス mg

(1hr) 生理食塩水 250mL

全量

mL

## CPT-11+Cetuximab療法

### 標準投与量:

Cetuximab 250(初回400) mg/m<sup>2</sup> day1,8,15,22

CPT-11 150 mg/m<sup>2</sup> day1,15