

ブイーンD

500mL

7%メイロン

20mL

①

(200mL/h)



# 精巣腫瘍に対する TIP療法(P<sub>TX</sub>+I<sub>FO</sub>+C<sub>DDP</sub>)

(パクリタキセル+イホマイド+シスプラチン) RPHW DRPHW

2011年03月08日 承認  
2020年02月17日 改訂(第11版)


Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ( )コース目	コース予定	□調製可 □TEL連絡後調製			
アルコール過敏症	備考[標準投与量逸脱など]	放射線併用	【調製指示(2日目以降)】			
<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり(慎重投与)		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	□調製可 □TEL連絡後調製			

Day 1 ( / )



Day2 ( / ) ~ Day6 ( / )



Day 2 ( / )

《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル 125mg 1カプセル

Day 3 ( / ) ~ Day6 ( / )

《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

TIP療法

標準投与量:

CDDP	20 mg/m <sup>2</sup>	day2-6
IFO	1,200 mg/m <sup>2</sup>	day2-6
PTX	175 mg/m <sup>2</sup>	day1

4週毎