

乳癌に対する GEM+wPTX療法

(ゲムシタビン+パクリタキセル)

DRPHW_DRPHW_1

2010年03月09日 承認
2019年09月25日 改訂(第6版)


Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示(初日)】	
	月	日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
アルコール過敏症	備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2回目以降)】	
<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり(慎重投与)					<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
放射線併用						
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無						

Day1(/) ・ Day8(/)



投与スケジュール

	1コース			2コース		
day	1	8	15	22	29	36
GEM (2投1休)	↓	↓	休	↓	↓	休 ...
PTX (2投1休)	↓	↓	休	↓	↓	休 ...

GEM+wPTX療法

標準投与量:

GEM 1,000 mg/m² day1,8

PTX 80 mg/m² day1,8

3週毎(2投1休)